



• **Gabb 32** •

Le groupement des Agriculteurs **BIO** du Gers

Compte-rendu Itinéraire technique tomate Jardins de Mesples 20/07/2015

Présentation de l'exploitation de Sébastien

Installation et conversion en bio en 2000.

4.5ha de Plein champs (moitié en culture : courges, poireaux, choux et moitié en engrais verts : sorgho fourrager) et 1ha de serre

1.5ha de verger (dont des mirabelliers)

1.5ha d'engrais verts (sorgho fourrager)

Type de sol : argilo-calcaire

Débouchés :

2 AMAP (Fontenilles et saint Lys) : 70 paniers/semaine

Biocoop (Auch), Intermarché de Condom, restaurants

Vente de panier pour Bianchi (environ 50 par mois)



UTH : environ 2

Sébastien + 1employé (30h/semaine) + aide de son père

Membre de BIOLOGERS

Itinéraire technique tomate

Préparation du sol

Passage roto bêche

Cultilabour (15 cm)

Variétés

Essentiellement F1 (Myriade, Previa...). Achats des semences chez Voltz.

Date de semis et plantation

Semis mi-février et plantation début avril puis tous les 15 jours jusqu'à début juin.

Plantation

Distance de plantation : Plantation tous les 40 cm environ avec de l'œillet d'inde planté sur le rang tous les 2 pieds de tomates environ (éloignement des ravageurs).

Les inter-rangs sont tondus.

Durée de plantation : environ 800 à 1000 pieds/heure (avec la machine et sans paillage plastique)

Attache :

Dès la plantation, les tomates sont attachées grâce à un nœud à la base :

<http://youtu.be/Q1VK7ciKXUE> : vidéo du nœud coulissant permettant de ne pas serrer le pied de tomate lors de sa croissance.

La ficelle est ensuite enroulée autour de la tomate puis attachée en haut de la serre à l'aide d'échasses.



Echasses permettant d'attacher les ficelles en haut de la serre

Dates de premières et dernières récoltes

Première récolte : entre le 1^{er} et le 10 juin 2015

Dernière récolte : fin août (à partir de fin août, les pieds sont arrachés pour laisser de la place aux cultures d'hiver).

Fertilisation (fiches produits à demander au Gabb32 : fréquence, doses...)

VitiFuche : fumier de cheval et/ou plumes de volailles (incorporé au sol après chaque fin de culture)

Algo Tonic : activateur de sol (2 seaux pour 400m²)

Isotonic bio : stimulateurs de croissance

Irrigation

Aspersion 1 fois par semaine (voir 2 en cas de forte chaleur)

Maladies

Présence légère de cul noir de la tomate

Pas de ravageurs (grâce à aux œillets d'inde)

Pollinisation

Présence de ruches chez le voisin donc pas de ruches à bourdon dans les serres.

Fil de fer où sont attachées les ficelles



Variétés Myriade



Sol très aéré sous la serre

Avec le soutien financier de :

